

# 意思決定科学

## ゲーム理論1

堀田 敬介

2015/11/2, Fri. ~

# Contents

## ● ケーキを仲良く！


- アルゴリズムと解の性質
- The Steinhaus' loan divider procedure
- The Banach-Knaster last-dimisher procedure

## ● ゲーム理論とは何か？

- ゲームの定義

## ● 2人非協力零和ゲーム

- ミニマックス原理と均衡解
- 純粋戦略と混合戦略, ミニマックス定理
- 2人零和ゲームと線形計画



# ケーキを仲良く

Bob と Carol にケーキ(丸々1個！)を買ってきた。  
2人に均等に与えたいのだが、2人は自分の分が  
相手より小さいと不満を言い、けんかになる。



どうしたら  
いいだろう？



仮定：The cake is divisible: it can be cut at any point without destroying its value.

# ケーキを仲良く

## ◆ You Cut, I Choose ! (One divides, the other chooses.)

- Bobにケーキを切らせ, Carolにケーキを選ばせる

ただし, これはこの問題の「解」ではなく「アルゴリズム」!

(Bobにどのように切らせるかの指定はない. Bobは自分の意思で切る)  
(Carolにどのように選ばせるかの指定はない. Carolは自分の意思で選ぶ)

## ◆ 解は...

- Bob divides the cake into two pieces, between which he is indifferent; and Carol chooses what she considers to be the larger piece. (from ``Fair Division'', p.9)

# ケーキを仲良く

## ◆「解」が持ってほしい2つの性質

- proportionality (An allocation is proportional.)
  - Each thinks he or she received a portion that has size or value of **at least  $1/n$** .
- envy-freeness (An allocation is envy-free.)
  - Every player thinks he or she receives a portion that is at least tied for largest, or tied for most valuable and, hence, **does not envy** any other player.

プレイヤーが2人の場合はこの2つの概念は等価

# ケーキを仲良く (3人いたら?)

H. Steinhaus, 1948

## ◆ The Steinhaus' lone-divider procedure (3 players)

1. Bob がケーキを3分割するように切る (切り方は自由であることに注意)

2-1. Carol が acceptable cake とそうでないものを指摘

2-2. Ted も Carol と同様のことを行う.

(CarolもTedも, 少なくとも1つは acceptable であることに注意)

3. case1: Carol(or Ted)が2個以上 acceptable cake がある場合

Ted→Carol→Bob (or Carol→Ted→Bob) の順にケーキを取る

case2: Carol, Tedとも acceptable cake が高々1個の場合

Carol, Tedとも acceptable でないケーキを Bob にあげて, 残りのケーキについて2人で[divide-and-choose]を行う.

def.) call a piece acceptable to a player  
if he or she thinks the piece is at least  $1/3$  of the cake.

# ケーキを仲良く（3人いたら？）

## ◆ The Steinhaus' loan-divider procedure (3 plays)

- proportional division を保証する各プレイヤーの戦略
  - Bobはちょうど $1/3$ （とBobが思う）piece に切る
  - Carol, Ted は acceptable cake を取る
- envy-free ではない
  - case1: Bob, Ted は誰も妬まないが, Carol は Ted を妬む可能性がある. (Tedが, 彼女が考える acceptable cake の大きい方を取る可能性があるので)
  - case2: Carol, Ted は誰も妬まないが, Bob は Carol か Ted のいずれかを妬む可能性がある. (Carol と Ted の [divide-and-choose] の結果が Bob から見て 50-50 に思えない場合, 2人のいずれかが $1/3$ 以上（とBobが思う）cake を得るので)

# ケーキを仲良く (n人いたら?)

H.W. Kuhn, 1967

- ◆ Kuhn が The Steinhaus' loan-divider procedure (3 players) を n人版に拡張

- Frobenius & Konig の combinatorial theorem に基づくアルゴリズム)
- 4人版は Steinhaus も気づいていたらしい

S. Banach-B. Knaster, mid-1940

- ◆ **The Banach-Knaster last-diminisher procedure**

- Steinhaus が 1948年に2人(学生, ポーランド人)のアイデアを論文の形で発表

- ◆ .....



# ケーキを仲良く

S. Banach-B. Knaster, mid-1940

## ◆ The Banach-Knaster last-diminisher procedure

- The partners being ranged **A,B,C,...,N**.
- **A** cuts from the cake an arbitrary part.
- **B** has now the right, but is not obliged, to diminish the slice cut off.
- Whatever he does, **C** has the right (without obligation) to diminish still the already diminished (or not diminished) slice,
- and so on up to **N**.
- The rule obliges the ``last-diminisher'' to take as his part the slice he was the last to touch. This partner thus disposed of, the remaining  $n-1$  persons start the same game with the remainder of the cake.
- After the number of participants has been reduced to two, they apply the classical [divide-and-choose] rule for halving the remainder.

(from ``Fair Division'', p.35 [Steinhaus' description 1948 p.102])

# ケーキを仲良く

## ◆ The last-dimisher procedure

- proportional division を保証する各プレイヤーの戦略
  - 切るプレイヤーがちょうど  $1/n$  と考える piece に切ること
- envy-freeではない
  - 理由: 例えば, ゲームを先に抜けたプレイヤーAが, ある段階で切られたケーキが  $1/n$  より大きい(とAが思う)ときでもそれを阻止できない. 結果として  $1/n$  より大きいケーキが誰か(例えばB)に行く(とAが思う)ので, AはBを妬む.



# ゲーム理論とは何か？

- ◆ ゲーム的状况 game situations
  - 複数の意思決定主体(プレイヤー)が存在し, 各々目的を持ち, その実現を目指して相互に依存しあっている状況
- ◆ ゲーム理論 game theory
  - ゲーム的状况を数理モデルを用いて定式化し, プレイヤー間の利害の対立と協力を分析する理論

J. von Neumann & O. Morgenstern  
「ゲーム理論と経済行動」(1944)



**John von Neumann (1903-1957)**  
2004年11月9日(火)取得の情報

# ゲーム理論とは何か？

## ◆ プレイヤー player

- 意思決定し、行動する主体. (2人, 3人, ..., n人, ...,  $\infty$ )
  - 例: 個人, 複数の個人から成る組織, 政党, 国家, ...

プレイヤーの集合

$$N = \{1, 2, \dots, n\}$$

## ◆ 戦略 strategy

- プレイヤーが取りうる行動. (有限, 無限)

プレイヤー $i$ の戦略集合

$$S_i = \{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{im}\} \quad (i \in N)$$

## ◆ 利得と利得関数 payoff

- 各プレイヤーの戦略決定後, ゲームは終了し, 結果が出る. 結果に対する各プレイヤーの何らかの評価値. 利得 payoff, 効用 utility.

プレイヤー $i$ の利得関数

$$f_i : S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \rightarrow R \quad (i \in N)$$

ゲームの定義


$$G = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{f_i\}_{i \in N})$$

各プレイヤーは**自己の利得最大化**を目指し,  
**G**は全てのプレイヤーの**共有知識**とする

# ゲーム理論とは何か？

## ◆ ゲームの表現形式

- 展開形 extensive form



- 戦略形 strategic form, 標準形 normal form

| A \ B    | $S_{B1}$ | $S_{B2}$ |
|----------|----------|----------|
| $S_{A1}$ | 3        | 1        |
| $S_{A2}$ | -4       | 6        |

# ゲーム理論とは何か？

## ◆ 非協力ゲームと協力ゲーム

- 各プレイヤーの戦略決定における前提

1. プレイヤー間には、各プレイヤーがとるべき戦略について、強制力のある取り決めは存在しない.

拘束的合意が成立しない

非協力ゲーム

2. 全てのプレイヤー間に、とるべき戦略についての合意が成り立ち、それに基づいて戦略決定する.

拘束的合意が成立

協力ゲーム

# ゲーム理論とは何か？

出展:「数学セミナー」2014(v53,n10)p.9 渡辺隆裕

## ◆ 例) 喫茶店ダタールとスタボが2地域A,Bへの出店を検討中

- 各地域の1日あたり喫茶店利用見込み客は,  $A=600$ 人,  $B=300$ 人
- 両店舗が別々の地域に出店すると, 見込み客を全て獲得できる
- 両店舗が同じ地域に出店すると, スタボがダタールの2倍の客を獲得
- 同時にどちらか1地域に必ず出店(両方出店や出店中止はない)

## ◆ 問: ダタールはどちらに出店すべきか? またそれは何故か?

| ダタ\スタ | A地域       | B地域       |
|-------|-----------|-----------|
| A地域   | (200,400) | (600,300) |
| B地域   | (300,600) | (100,200) |

## ◆ 検討

- マキシミン基準(悲観的意思決定基準) → A地域へ出店せよ
- マキシマックス基準(楽観的意思決定基準) → A地域へ出店せよ
- ラプラス基準(平均値) → A地域へ出店せよ
- **ゲーム理論**による解答 → **B地域へ**出店せよ

「1人の意思決定」と「複数の意思決定主体の相互作用であるゲーム」では解が異なる!

# 2人非協力零和ゲーム



# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ Example1:

- 2人のプレイヤーA君とBさんが「コインあわせゲーム」をしている
- プレイヤーは同時にコインの表か裏を見せ合う
- 2人のプレイヤーの見せた面が同じならA君の勝ち, 異なるならBさんの勝ち
- 表を出して勝ったら相手から2円貰い, 裏を出して勝ったら相手から1円貰う

$$N=\{1, 2\}$$

$$S_i=\{s_{i1}, s_{i2}\}, \quad (i \in N)$$

$$S_1=\{\text{表}, \text{裏}\}, \quad S_2=\{\text{表}, \text{裏}\}$$

$$f_i: S_1 \times S_2 \rightarrow R, \quad (i \in N)$$


$$\begin{aligned} f_1(\text{表}, \text{表}) &= 2 & + & f_2(\text{表}, \text{表}) = -2 & = 0 \\ f_1(\text{表}, \text{裏}) &= -1 & + & f_2(\text{表}, \text{裏}) = 1 & = 0 \\ f_1(\text{裏}, \text{表}) &= -2 & + & f_2(\text{裏}, \text{表}) = 2 & = 0 \\ f_1(\text{裏}, \text{裏}) &= 1 & + & f_2(\text{裏}, \text{裏}) = -1 & = 0 \end{aligned}$$

A君の利得表


| A \ B | 表  | 裏  |
|-------|----|----|
| 表     | 2  | -1 |
| 裏     | -2 | 1  |

Bさんの利得表

| A \ B | 表  | 裏  |
|-------|----|----|
| 表     | -2 | 1  |
| 裏     | 2  | -1 |



# 2人非協力零和ゲーム



## ◆ Example2:

- A君とBさんがゲームをしている. それぞれ3つずつの戦略があり, A君の利得表は以下の通りである. 2人は, 各々どんな戦略をとるべきか?

| A \ B    | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ |
|----------|----------|----------|----------|
| $s_{A1}$ | -2       | 4        | -1       |
| $s_{A2}$ | 2        | 2        | 1        |
| $s_{A3}$ | 4        | -3       | 0        |

# 2人非協力零和ゲーム

| $A \setminus B$ | $s_{B_1}$ | $s_{B_2}$ | $s_{B_3}$ |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| $s_{A_1}$       | -2        | 4         | -1        |
| $s_{A_2}$       | 2         | 2         | 1         |
| $s_{A_3}$       | 4         | -3        | 0         |

## ◆ ミニマックス原理 minimax principle

### • Example2でプレイヤーAの思考

最大化プレイヤー

- 戦略 $s_{A_1}$ を取ったときの最悪の事態は

$$\min(-2, 4, -1) = -2 \text{ (プレイヤーBが戦略 } s_{B_1} \text{ を取る)}$$

- 戦略 $s_{A_2}$ を取ったときの最悪の事態は

$$\min(2, 2, 1) = 1 \text{ (プレイヤーBが戦略 } s_{B_3} \text{ を取る)}$$

- 戦略 $s_{A_3}$ を取ったときの最悪の事態は

$$\min(4, -3, 0) = -3 \text{ (プレイヤーBが戦略 } s_{B_2} \text{ を取る)}$$



戦略 $s_{A_2}$ を取る (最悪でも利得1が保証される)

もっと良い利得を得ることができるのか？

## 2人非協力零和ゲーム

| $A \setminus B$ | $s_{B_1}$ | $s_{B_2}$ | $s_{B_3}$ |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| $s_{A_1}$       | -2        | 4         | -1        |
| $s_{A_2}$       | 2         | 2         | 1         |
| $s_{A_3}$       | 4         | -3        | 0         |

### ◆ ミニマックス原理 minimax principle

- Example2でプレイヤーAが**Bの立場で思考**

- Bが戦略 $s_{B_1}$ を取ったとき, Aである自分は戦略 $s_{A_3}$ を取る


$$\max(-2, 2, 4) = 4$$

- Bが戦略 $s_{B_2}$ を取ったとき, Aである自分は戦略 $s_{A_1}$ を取る

$$\max(4, 2, -3) = 4$$

- Bが戦略 $s_{B_3}$ を取ったとき, Aである自分は戦略 $s_{A_2}$ を取る

$$\max(-1, 1, 0) = 1$$



戦略 $s_{B_3}$ を取る (最悪でも損失1で済む)

Aは戦略 $s_{A_2}$ を取るとき, 利得1を得られ,  
それ以外の戦略を取ると利得が1以下になる.



# 2人非協力零和ゲーム

| $A \setminus B$ | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ |
|-----------------|----------|----------|----------|
| $s_{A1}$        | -2       | 4        | -1       |
| $s_{A2}$        | 2        | 2        | 1        |
| $s_{A3}$        | 4        | -3       | 0        |

## ◆ 均衡点とゲームの値

- 2人のプレイヤーがともにミニマックス原理に基づいて行動すると、どうなるのか？


2人共に勝つことはあり得ない！



何らかの意味での**均衡**に到達

$$\min_j \max_i a_{ij} = \max_i \min_j a_{ij} = 1$$

やむを  
えない...



しかた  
ない...



2人零和ゲームが  
「厳密に決定される strictly determined」  
「厳密に確定的である」

$(s_{A2}^*, s_{B3}^*)$ : ゲームの均衡点 equilibrium point

# 演習1:

- ◆ プレイヤーAの利得表が以下の表で与えられるゲームを考える.  
プレイヤーA, Bがそれぞれミニマックス原理に基づいて戦略決定をすると, ゲームの解はどうなるか? (1), (2)それぞれのゲームについて考えよ

(1)

| A \ B     | $s_{B_1}$ | $s_{B_2}$ | $s_{B_3}$ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $s_{A_1}$ | 3         | 1         | -1        |
| $s_{A_2}$ | -1        | 0         | 2         |
| $s_{A_3}$ | 5         | 2         | 3         |

(2)

| A \ B     | $s_{B_1}$ | $s_{B_2}$ | $s_{B_3}$ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $s_{A_1}$ | 5         | 6         | 4         |
| $s_{A_2}$ | 1         | 8         | 2         |
| $s_{A_3}$ | 7         | 2         | 3         |

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 純粋戦略と混合戦略

- Example3:

- A君とBさんがゲームをしている. それぞれ3つずつの戦略があり, A君の利得表は以下の通りである. 2人は, 各々どんな戦略をとるべきか?

| A \ B    | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ |
|----------|----------|----------|----------|
| $s_{A1}$ | -4       | 2        | 0        |
| $s_{A2}$ | 4        | 3        | 1        |
| $s_{A3}$ | 1        | -3       | 2        |

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 純粋戦略と混合戦略

- Example3:

| $A \setminus B$ | $s_{B_1}$ | $s_{B_2}$ | $s_{B_3}$ | min                            | max |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----|
| $s_{A_1}$       | -4        | 2         | 0         | -4                             | 1   |
| $s_{A_2}$       | 4         | 3         | 1         | 1                              |     |
| $s_{A_3}$       | 1         | -3        | 2         | -3                             |     |
| max             | 4         | 3         | 2         | 1                              |     |
| min             | 2         |           |           | $2 = v_1 = \min_{i \in I} v_i$ |     |

マキシミン戦略

$$1 = v_1 = \max_i \min_j a_{ij}$$

×

$$2 = v_2 = \min_j \max_i a_{ij}$$

ミニマックス戦略

ミニマックス均衡点が存在しない！？

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 純粋戦略と混合戦略

- Proposition1

利得行列  $A=[a_{ij}]$  が与えられた時, 以下が成り立つ

$$\max_i \min_j a_{ij} \leq \min_j \max_i a_{ij}$$

ゲームは常に厳密に決定されるとは限らない！



いかなる場合に均衡点が存在し,  
ゲームが厳密に確定的であるか？

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 純粋戦略と混合戦略

### • 鞍点 saddle point

- 行列  $A=[a_{ij}]$  において, 任意の  $i, j$  に対し,


$$a_{ij_0} \leq a_{i_0j_0} \leq a_{i_0j}$$

が成り立つとき,  $(i_0, j_0)$  をこの行列の 鞍点 といい,  $a_{i_0j_0}$  を 鞍点値 という.

$$a_{ij_0} \leq a_{i_0j_0}$$

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j_0} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i_01} & \cdots & a_{i_0j_0} & \cdots & a_{i_0n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj_0} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$a_{i_0j_0} \leq a_{i_0j}$$



# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 純粋戦略と混合戦略

- Theorem1

- (行列)ゲームが厳密に確定的であるための必要十分条件は, その利得行列Aに少なくとも1つの鞍点が存在すること. またこのとき, 鞍点が均衡点.

- 最適戦略 optimal strategy

- 均衡点  $(i^*, j^*)$  は鞍点なので, プレイヤーAが戦略  $i^*$  を用いると, プレイヤーBがいかなる戦略をとっても少なくとも  $v(A)$  を得ることができ, また, Bが戦略  $j^*$  を取る限り, Aは戦略を変えても利得を増加させることはできない.



戦略  $i^*$  がAの最適戦略


# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 純粋戦略と混合戦略

### • Theorem2

- 厳密に確定的な零和ゲームにおいて、均衡点が複数ある場合、各均衡点の値は等しい。また、 $(i^*, j^*)$ ,  $(i_0, j_0)$  が均衡点ならば、 $(i^*, j_0)$ ,  $(i_0, j^*)$  も均衡点である。

均衡戦略は交換可能



# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 純粋戦略と混合戦略

- Example3:

| A \ B    | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ |
|----------|----------|----------|----------|
| $s_{A1}$ | -4       | 2        | 0        |
| $s_{A2}$ | 4        | 3        | 1        |
| $s_{A3}$ | 1        | -3       | 2        |

完全予見は不可能！

決断は下さねばならない！

主体的な賭，  
最適な賭の確率

期待効用原理

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 純粋戦略と混合戦略

- Example3:

$$p_i \geq 0, (i = 1, 2, 3)$$
$$p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

$$q_j \geq 0, (j = 1, 2, 3)$$

$$q_1 + q_2 + q_3 = 1$$

| A \ B            | $q_1$    | $q_2$    | $q_3$    |
|------------------|----------|----------|----------|
|                  | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ |
| $p_1$ → $s_{A1}$ | -4       | 2        | 0        |
| $p_2$ → $s_{A2}$ | 4        | 3        | 1        |
| $p_3$ → $s_{A3}$ | 1        | -3       | 2        |

混合戦略

mixed strategy

純粋戦略

pure strategy

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 純粋戦略と混合戦略

- Example3:

|       |                 |           |           |           |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|       |                 | $q_1$     | $q_2$     | $q_3$     |
|       | $A \setminus B$ | $s_{B_1}$ | $s_{B_2}$ | $s_{B_3}$ |
| $p_1$ | $s_{A_1}$       | -4        | 2         | 0         |
| $p_2$ | $s_{A_2}$       | 4         | 3         | 1         |
| $p_3$ | $s_{A_3}$       | 1         | -3        | 2         |

- player Aの期待効用 (player A = 期待**効用最大化**プレイヤー = **maximin player**)

$$\begin{cases} E_1(\mathbf{p}, s_{B_1}) = -4p_1 + 4p_2 + p_3 & \leftarrow \text{player B が戦略 } s_{B_1} \text{ の時の期待効用} \\ E_1(\mathbf{p}, s_{B_2}) = 2p_1 + 3p_2 - 3p_3 & \leftarrow \text{player B が戦略 } s_{B_2} \text{ の時の期待効用} \\ E_1(\mathbf{p}, s_{B_3}) = p_2 + 2p_3 & \leftarrow \text{player B が戦略 } s_{B_3} \text{ の時の期待効用} \end{cases}$$

- player Bの期待損失 (player B = 期待**損失最小化**プレイヤー = **minimax player**)

$$\begin{cases} E_2(s_{A_1}, \mathbf{q}) = -4q_1 + 2q_2 & \leftarrow \text{player A が戦略 } s_{A_1} \text{ の時の期待損失} \\ E_2(s_{A_2}, \mathbf{q}) = 4q_1 + 3q_2 + q_3 & \leftarrow \text{player A が戦略 } s_{A_2} \text{ の時の期待損失} \\ E_2(s_{A_3}, \mathbf{q}) = q_1 - 3q_2 + 2q_3 & \leftarrow \text{player A が戦略 } s_{A_3} \text{ の時の期待損失} \end{cases}$$

補足: A, Bが各々混合戦略 $(p_1, p_2, p_3)$ ,  $(q_1, q_2, q_3)$ のとき

$$\begin{cases} E_1(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = E(\mathbf{p}, s_{B_1})q_1 + E(\mathbf{p}, s_{B_2})q_2 + E(\mathbf{p}, s_{B_3})q_3 \\ E_2(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = E(s_{A_1}, \mathbf{q})p_1 + E(s_{A_2}, \mathbf{q})p_2 + E(s_{A_3}, \mathbf{q})p_3 \end{cases}$$

$$E(\mathbf{p}, \mathbf{q}) := E_1(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = E_2(\mathbf{p}, \mathbf{q})$$

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 戦略の支配

- Example3:

| A \ B    | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ |
|----------|----------|----------|----------|
| $s_{A1}$ | -4       | 2        | 0        |
| $s_{A2}$ | 4        | 3        | 1        |
| $s_{A3}$ | 1        | -3       | 2        |

被支配戦略

支配戦略

支配する  
dominate

戦略の支配 domination of strategies  
プレイヤー  $i$  の戦略  $h, k$  について、  
戦略  $h$  が戦略  $k$  を支配するとは、  
任意の  $s_{-i} \in S_{-i}$  に対して、

$$f_i(s_{-i}, h) > f_i(s_{-i}, k)$$

が成立すること。

• =だと「同等」

•  $\geq$  かつ  $\neq$   
だと「弱支配」

補足) 通常は、被弱支配戦略は  
除去しない → 共有地の悲劇

被支配戦略除去の原理  
「支配される戦略は用いない」

| A \ B    | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ |
|----------|----------|----------|----------|
| $s_{A2}$ | 4        | 3        | 1        |
| $s_{A3}$ | 1        | -3       | 2        |

| A \ B    | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ |
|----------|----------|----------|
| $s_{A2}$ | 3        | 1        |
| $s_{A3}$ | -3       | 2        |

補足: 被支配戦略除去の原理による均衡点が存在  
→ ゲームは支配可解 dominance solvable

# 2人非協力零和ゲーム

|                 |           | $q_2$     | $q_3$     |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| $A \setminus B$ |           | $s_{B_2}$ | $s_{B_3}$ |
| $p_2$           | $s_{A_2}$ | 3         | 1         |
| $p_3$           | $s_{A_3}$ | -3        | 2         |

## ◆ 最適混合戦略


### • Example3:

- player A = 期待効用最大化プレイヤー = **maximin player**

$$\begin{cases} E(\mathbf{p}, (1,0)) = 6p_2 - 3 & \leftarrow \text{player B が戦略 } s_{B_2} \text{ の時の期待効用} \\ E(\mathbf{p}, (0,1)) = -p_2 + 2 & \leftarrow \text{player B が戦略 } s_{B_3} \text{ の時の期待効用} \end{cases}$$

- player B = 期待損失最小化プレイヤー = **minimax player**

$$\begin{cases} E((1,0), \mathbf{q}) = 2q_2 + 1 & \leftarrow \text{player A が戦略 } s_{A_2} \text{ の時の期待損失} \\ E((0,1), \mathbf{q}) = -5q_2 + 2 & \leftarrow \text{player A が戦略 } s_{A_3} \text{ の時の期待損失} \end{cases}$$




# 2人非協力零和ゲーム

$$\begin{aligned}
 E(\mathbf{p}, \mathbf{q}) &= E(\mathbf{p}, s_{B_2})q_2 + E(\mathbf{p}, s_{B_3})q_3 \\
 &= (3p_2 - 3p_3)q_2 + (p_2 + 2p_3)q_3 \\
 &= (3p_2 - 3(1-p_2))q_2 + (p_2 + 2(1-p_2))(1-q_2) \\
 &= \begin{pmatrix} p_2 & 1-p_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_2 \\ 1-q_2 \end{pmatrix} = -E_2(\mathbf{p}, \mathbf{q})
 \end{aligned}$$

## ◆ 最適混合戦略

- Example 3:




# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 最適混合戦略




- Example 3:

|       |                 | $q_2$     | $q_3$     |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| $p_2$ | $A \setminus B$ | $s_{B_2}$ | $s_{B_3}$ |
|       | $s_{A_2}$       | 3         | 1         |
| $p_3$ | $s_{A_3}$       | -3        | 2         |



player A  
maximin player

player B  
minimax player



# 2人非協力零和ゲーム

|       |                 | $q_2$    | $q_3$    |
|-------|-----------------|----------|----------|
|       | $A \setminus B$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ |
| $p_2$ | $s_{A2}$        | 3        | 1        |
| $p_3$ | $s_{A3}$        | -3       | 2        |

## ◆ 混合戦略の意味

- $p^*, q^*$  の確率のくじをつかって, 引いていずれかに決する方法が, なぜ合理的な決定方法なのか?

Aの最適戦略  $p^* = (0, 5/7, 2/7)$

Bの最適戦略  $q^* = (0, 1/7, 6/7)$

- player A は  $s_{A2}$  なら 3,  $s_{A3}$  なら 2 が望ましいが,  
 $p_2^* q_3^* + p_3^* q_2^* = 32/49$  の確率で望ましくない結果になる.

しかし, これは事後的



しまった!

- このような状況も全て考慮に入れた上で, 最適戦略が決定された!

## 演習2:

- プレイヤーAの利得表が以下の表で与えられるゲームを考える.  
プレイヤーA, Bがそれぞれ期待効用原理に基づいて戦略決定  
をすると, ゲームの解はどうなるか?

(1)

| $A \setminus B$ | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ |
|-----------------|----------|----------|
| $s_{A1}$        | 4        | -2       |
| $s_{A2}$        | -3       | 3        |

(2)

| $A \setminus B$ | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ |
|-----------------|----------|----------|
| $s_{A1}$        | 3        | 1        |
| $s_{A2}$        | -1       | 5        |

(3)

| $A \setminus B$ | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ | $s_{B4}$ |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| $s_{A1}$        | 3        | 1        | 3        | 4        |
| $s_{A2}$        | 4        | 4        | 2        | 3        |
| $s_{A3}$        | 2        | 3        | 1        | 2        |

(4)

| $A \setminus B$ | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ |
|-----------------|----------|----------|----------|
| $s_{A1}$        | 3        | 2        | 4        |
| $s_{A2}$        | -1       | 3        | 0        |
| $s_{A3}$        | 2        | 1        | -2       |

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ ミニマックス定理

- プレイヤーA, Bの純粋戦略

$$S_A = \{s_{A_i} \mid i = 1, \dots, m\}, S_B = \{s_{B_j} \mid j = 1, \dots, n\}$$

- プレイヤーAの利得行列 (Bの損失行列)

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

### 利得関数

$$E(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \mathbf{p}^T A \mathbf{q} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i q_j$$

- プレイヤーA, Bの混合戦略

$$\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_m) \quad \xrightarrow{\text{red}} \quad s_{A_i} = (0, \dots, 1, \dots, 0)$$
$$\begin{cases} p_1 + \dots + p_m = 1 \\ p_1, \dots, p_m \geq 0, \end{cases}$$

$$\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n) \quad \xrightarrow{\text{blue}} \quad s_{B_j} = (0, \dots, 1, \dots, 0)$$
$$\begin{cases} q_1 + \dots + q_n = 1 \\ q_1, \dots, q_n \geq 0 \end{cases}$$

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ ミニマックス定理

- プレイヤーAの保証水準

$$\min_q E(p, q) \longrightarrow v_1 = \max_p \min_q E(p, q)$$

$p$  を操作して期待利得最大

- プレイヤーBの保証水準

$$\max_p E(p, q) \longrightarrow v_2 = \min_q \max_p E(p, q)$$

$q$  を操作して期待損失最小

- Proposition2

$$\max_p \min_q E(p, q) \leq \min_q \max_p E(p, q)$$

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ ミニマックス定理

J. von Neumann, 1928

### • Theorem3

$$\max_p \min_q E(p, q) = \min_q \max_p E(p, q)$$

また, これを成立させる戦略の組  $(p^*, q^*)$  を **均衡点** といい, 均衡点における利得  $v(A)$  をゲームの値という.

$$v(A) := p^{*T} A q^* = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i^* q_j^*$$

均衡点における  
戦略が **最適戦略**

### • Theorem4

戦略の組  $(p^*, q^*)$  が均衡点であるための必要十分条件は,  $(p^*, q^*)$  が関数  $E(p, q)$  の **鞍点** であること. 即ち,

$$\forall p, q, \quad E(p, q^*) \leq E(p^*, q^*) \leq E(p^*, q)$$

が成立すること.

Bが $q^*$ の時, Aは $p^*$ にするのが**利得最大**

Aが $p^*$ の時, Bは $q^*$ にするのが**損失最小**

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ ミニマックス定理

### • Theorem5

$v(A)$  がゲームの値,  $(p^*, q^*)$  が均衡点であるための必要十分条件は

$$\forall i, j, \quad \underline{E(s_{A_i}, q^*)} \leq \underline{E(p^*, q^*)} \leq \underline{E(p^*, s_{B_j})}$$

が成立すること.

$$\forall i = 1, \dots, m, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j^* \leq E(p^*, q^*)$$

$$\forall j = 1, \dots, n, \quad E(p^*, q^*) \leq \sum_{i=1}^m a_{ij} p_i^*$$

## 2人非協力零和ゲーム

## ◆ ミニマックス定理

- Example4

|                 |           | $q_1$     | $q_2$      | $q_3$       | $q_4$     | $q_5$     |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| $A \setminus B$ |           | $s_{B_1}$ | $s_{B_2}$  | $s_{B_3}$   | $s_{B_4}$ | $s_{B_5}$ |
| $p_1$           | $s_{A_1}$ | -2        | -1 < 2     | 3 ≤ 3       |           |           |
| $p_2$           | $s_{A_2}$ | 5<br>v    | 2 < 4<br>v | -1 ≤ 0<br>v |           |           |
|                 | $s_{A_3}$ | 4         | 1          | 3           | -2        | -1        |


$$E(\mathbf{p}, s_{B_1}) = -2p_1 + 5p_2 = -7p_1 + 5$$

~~$$E(\mathbf{p}, s_{B_2}) = -p_1 + 2p_2 = -3p_1 + 2$$~~

$$E(\mathbf{p}, s_{B_3}) = 2p_1 + 4p_2 = -2p_1 + 4$$

$$E(\mathbf{p}, s_{B_4}) = 3p_1 - p_2 = 4p_1 - 1$$

~~$$E(\mathbf{p}, s_{B_5}) = 3p_1$$~~




$$\mathbf{p}^* = (\frac{4}{7}, \frac{3}{7}, 0)$$

# 2人非協力零和ゲーム


## ◆ ミニマックス定理

- Example5: 一般の $2 \times 2$ ゲーム

|       |           | $q_1$     | $q_2$     |
|-------|-----------|-----------|-----------|
|       | A \ B     | $s_{B_1}$ | $s_{B_2}$ |
| $p_1$ | $s_{A_1}$ | $a_{11}$  | $a_{12}$  |
| $p_2$ | $s_{A_2}$ | $a_{21}$  | $a_{22}$  |



鞍点が存在すればそれが均衡点.  
なければ, 混合戦略を考えるが,  
このとき, 必ず  $E(p, s_{B_1})$  と  $E(p, s_{B_2})$  及  
び  $E(s_{A_1}, q)$  と  $E(s_{A_2}, q)$  は交点を持つ.



$$\begin{cases} E(p, s_{B_1}) = a_{11}p_1 + a_{21}p_2 \\ E(p, s_{B_2}) = a_{12}p_1 + a_{22}p_2 \\ E(s_{A_1}, q) = a_{11}q_1 + a_{12}q_2 \\ E(s_{A_2}, q) = a_{21}q_1 + a_{22}q_2 \end{cases}$$

### 均衡点

$$(p_1^*, p_2^*) = \left( \frac{a_{22} - a_{21}}{a_{11} - a_{21} + a_{22} - a_{12}}, \frac{a_{11} - a_{12}}{a_{11} - a_{21} + a_{22} - a_{12}} \right)$$

$$(q_1^*, q_2^*) = \left( \frac{a_{22} - a_{12}}{a_{11} - a_{12} + a_{22} - a_{21}}, \frac{a_{11} - a_{21}}{a_{11} - a_{12} + a_{22} - a_{21}} \right)$$

## 演習3:

- ◆ プレイヤーAの利得表が以下の表で与えられるゲームを考える.  
プレイヤーA, Bがそれぞれ期待効用原理に基づいて戦略決定  
をすると, ゲームの解はどうなるか?

(1)

| $A \setminus B$ | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ |
|-----------------|----------|----------|
| $s_{A1}$        | 4        | -2       |
| $s_{A2}$        | -3       | 3        |

(2)

| $A \setminus B$ | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ |
|-----------------|----------|----------|
| $s_{A1}$        | 3        | 1        |
| $s_{A2}$        | -1       | 5        |

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 2人零和ゲームと線形計画法

- プレイヤーAの利得行列と混合戦略  $p$

$$\begin{matrix} p_1 & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{bmatrix} \\ p_2 & \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \end{bmatrix} \\ \vdots & \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix} \\ p_m & \begin{bmatrix} a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

まとめると...

$$\begin{array}{l} \max. u \\ \text{s.t. } a_{11}p_1 + \cdots + a_{m1}p_m \geq u \\ \quad a_{12}p_1 + \cdots + a_{m2}p_m \geq u \\ \quad \quad \quad \vdots \\ \quad a_{1n}p_1 + \cdots + a_{mn}p_m \geq u \\ \quad p_1 + \cdots + p_m = 1 \\ \quad p_1, \quad \cdots, \quad p_m \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{cases} E(\mathbf{p}, s_{B_1}) = a_{11}p_1 + a_{21}p_2 + \cdots + a_{m1}p_m \\ E(\mathbf{p}, s_{B_2}) = a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + \cdots + a_{m2}p_m \\ \vdots \\ E(\mathbf{p}, s_{B_n}) = a_{1n}p_1 + a_{2n}p_2 + \cdots + a_{mn}p_m \end{cases}$$

$$\max_p \min \{E(\mathbf{p}, s_{B_1}), E(\mathbf{p}, s_{B_2}), \cdots, E(\mathbf{p}, s_{B_n})\}$$

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 2人零和ゲームと線形計画法

- プレイヤーBの損失行列(Aの利得行列)と混合戦略  $q$

$$\begin{matrix} & q_1 & q_m & \cdots & q_n \\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} E(s_{A_1}, \mathbf{q}) = a_{11}q_1 + a_{12}q_2 + \cdots + a_{1n}q_n \\ E(s_{A_2}, \mathbf{q}) = a_{21}q_1 + a_{22}q_2 + \cdots + a_{2n}q_n \\ \vdots \\ E(s_{A_m}, \mathbf{q}) = a_{m1}q_1 + a_{m2}q_2 + \cdots + a_{mn}q_n \end{cases}$$

まとめると...

$$\begin{array}{l} \min. w \\ s.t. \quad a_{11}q_1 + \cdots + a_{1n}q_n \leq w \\ \quad \quad a_{21}q_1 + \cdots + a_{2n}q_n \leq w \\ \quad \quad \cdots \\ \quad \quad a_{m1}q_1 + \cdots + a_{mn}q_n \leq w \\ \quad \quad q_1 + \cdots + q_n = 1 \\ \quad \quad q_1, \cdots, q_n \geq 0 \end{array}$$

$$\min_q \max \{E(s_{A_1}, \mathbf{q}), E(s_{A_2}, \mathbf{q}), \cdots, E(s_{A_m}, \mathbf{q})\}$$

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 2人零和ゲームと線形計画法

プレイヤーAの最適化問題  
(LPの主問題: **P**)

$$\begin{array}{|l} \max . u \\ s.t. \quad a_{11} p_1 + \cdots + a_{m1} p_m \geq u \\ \quad \quad a_{12} p_1 + \cdots + a_{m2} p_m \geq u \\ \quad \quad \quad \dots \\ \quad \quad a_{1n} p_1 + \cdots + a_{mn} p_m \geq u \\ \quad \quad \quad p_1 + \cdots + p_m = 1 \\ \quad \quad \quad p_1, \dots, p_m \geq 0 \end{array}$$



プレイヤーBの最適化問題  
(LPの双対問題: **D**)

$$\begin{array}{|l} \min . w \\ s.t. \quad a_{11} q_1 + \cdots + a_{1n} q_n \leq w \\ \quad \quad a_{21} q_1 + \cdots + a_{2n} q_n \leq w \\ \quad \quad \quad \dots \\ \quad \quad a_{m1} q_1 + \cdots + a_{mn} q_n \leq w \\ \quad \quad \quad q_1 + \cdots + q_n = 1 \\ \quad \quad \quad q_1, \dots, q_n \geq 0 \end{array}$$

注) (**P**) (**D**)ともに自明解 ( $\mathbf{p}=(1,0,\dots,0)$ ,  $\mathbf{q}=(1,0,\dots,0)$ )があるので実行可能。  
→双対定理より, 最適解が存在し, 最適値は一致する


### Theorem6

(**P**), (**D**)の最適解が $(\mathbf{p}^*, u^*)$ ,  $(\mathbf{q}^*, w^*)$ のとき,  $(\mathbf{p}^*, \mathbf{q}^*)$ がゲームの均衡点であり,  $v:=u^*=w^*$ がゲームの値である

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 2人零和ゲームと線形計画法

- Example6:じゃんけん

| A \ B                                                                                  |  Good |  |  | min | max |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  Good | 0                                                                                      | 2                                                                                  | -7                                                                                  | -7  | -2  |
|       | -2                                                                                     | 0                                                                                  | 4                                                                                   | -2  |     |
|      | 7                                                                                      | -4                                                                                 | 0                                                                                   | -4  |     |
| max                                                                                    | 7                                                                                      | 2                                                                                  | 4                                                                                   |     |     |
| min                                                                                    | 2                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |     |     |

マキシミン戦略

$$-2 = v_1 = \max_i \min_j a_{ij}$$

×

$$2 = v_2 = \min_j \max_i a_{ij}$$

ミニマックス戦略

- ◆ 両プレイヤーとも、支配戦略は存在しない。
- ◆ 純粋戦略ではミニマックス均衡点は存在しない。

# 2人非協力零和ゲーム

## ◆ 2人零和ゲームと線形計画法

- Example6:じゃんけん

|       |                                                                                     | $q_1$                                                                               | $q_2$                                                                               | $q_3$                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | A \ B                                                                               |  |  |  |
| $p_1$ |  | 0                                                                                   | 2                                                                                   | -7                                                                                  |
| $p_2$ |  | -2                                                                                  | 0                                                                                   | 4                                                                                   |
| $p_3$ |  | 7                                                                                   | -4                                                                                  | 0                                                                                   |

$$\begin{array}{l}
 \max . u \\
 \text{s.t.} \quad -2p_2 + 7p_3 \geq u \\
 \quad \quad 2p_1 - 4p_3 \geq u \\
 \quad \quad -7p_1 + 4p_2 \geq u \\
 \quad \quad p_1 + p_2 + p_3 = 1 \\
 \quad \quad p_1, p_2, p_3 \geq 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \min . w \\
 \text{s.t.} \quad 2q_2 - 7q_3 \leq w \\
 \quad \quad -2q_1 + 4q_3 \leq w \\
 \quad \quad 7q_1 - 4q_2 \leq w \\
 \quad \quad q_1 + q_2 + q_3 = 1 \\
 \quad \quad q_1, q_2, q_3 \geq 0
 \end{array}$$

自己双対線形計画問題  
self-dual LP

$$\begin{aligned}
 (p_1^*, p_2^*, p_3^*) &= (0.538462, 0.153846, 0.307692), \quad u^* = 0 \\
 (q_1^*, q_2^*, q_3^*) &= (0.538462, 0.153846, 0.307692), \quad w^* = 0
 \end{aligned}$$

## 演習4:

### ◆ LPによる均衡解の求解

- 2人のプレイヤーA, Bは, プレイヤーAの利得行列(Bの損失行列)が以下で与えられるゲームをする. 各プレイヤーの問題をLPで表し, 均衡解とゲームの値を求めよ.

| A \ B    | $s_{B1}$ | $s_{B2}$ | $s_{B3}$ | $s_{B4}$ | $s_{B5}$ |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $s_{A1}$ | 1        | 5        | -2       | -4       | 3        |
| $s_{A2}$ | 4        | -1       | 3        | 2        | -7       |
| $s_{A3}$ | -4       | 3        | 6        | -2       | 2        |
| $s_{A4}$ | 1        | 6        | -4       | 3        | -3       |
| $s_{A5}$ | -3       | -6       | 4        | 5        | 1        |

# 参考文献

- ◆ S.J. Brams & A.D. Taylor, ``Fair Division'', Cambridge Univ. Press (1996)
- ◆ 鈴木光男「ゲーム理論入門」共立出版(1981,2003(新装版))
- ◆ 鈴木光男「新ゲーム理論」勁草書房(1994)
- ◆ 岡田章「ゲーム理論」有斐閣(1996)
- ◆ 渡辺隆裕「ゲーム理論入門」日本経済新聞社(2008)
- ◆ 今野浩「線形計画法」日科技連(1987)
- ◆ 中山幹夫・武藤滋夫・舟木由喜彦「ゲーム理論で解く」有斐閣(2000)
- ◆ 武藤滋夫「ゲーム理論入門」日本経済新聞社(2001)
- ◆ 逢沢明「ゲーム理論トレーニング」かんき出版(2003)
- ◆ 今井春雄・岡田章編著「ゲーム理論の応用」勁草書房(2005)
- ◆ R.アクセルロッド「つきあい方の科学」ミネルヴァ書房(1998)